

【注】「電子（を）吸引（性・力）」→「電子（を）求引（性・力）」は、どちらの表記も存在しますが後者がより適切と判断して修正しました。数が多いので正誤表には入れていません。

ページ		問題番号など	訂正行	訂正前（誤）	訂正後（正）	訂正日
本冊	30	51（1）	---	〈問題文を変更〉	気体の状態方程式 $PV = nRT$ から、気体の密度 d 〔g/L〕を求める式を導け。ただし、 P 、 V 、 w 、 M はそれぞれ気体の圧力、体積、質量、分子量を表し、 T は絶対温度、 R は気体定数とする。	2024/4/5
本冊	36	63（3）	---	〈文末に追加〉	（気体定数 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol})$ ））	2024/4/5
本冊	40	73	6行目	〈文末に追加〉	（気体定数 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol})$ ）	2024/6/14
本冊	42	76（4）	---	〈文末に追加〉	（気体定数 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol})$ ））	2024/8/5
本冊	47	85	13行目	求める。	求めよ。	2024/8/5
本冊	47	86	8行目	〈文末に追加〉	（気体定数 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol})$ ））	2024/8/5
本冊	58	108（1）	1～2行目	反応物の濃度 C の変化する速さ	ヨウ化水素の分解速度－	2024/5/28
本冊	59	110	11行目	〈文末に追加〉	（気体定数 $R = 8.3 \text{ J} / (\text{K} \cdot \text{mol})$ ））	2024/8/5
本冊	60	111	1～4行目	〈問題文を変更〉	下表は、右図のような装置を用いた鉄（Ⅲ）イオンを触媒とする過酸化水素の分解反応で発生する酸素の体積から、過酸化水素水のモル濃度 $[H_2O_2]$ の時間による変化を求めたものである。	2024/8/19
本冊	64	118	7行目	〈文末に追加〉	（気体定数 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol})$ ））	2024/8/5
本冊	67	125	2行目	〈文末に追加〉	（気体定数 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol})$ ））	2024/8/5
本冊	67	126（2）	5行目	〈文末に追加〉	（気体定数 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol})$ ））	2024/8/5
本冊	71	---	ページ欄外	〈ページ左上に追加〉	問題130，131で，必要があれば，水のイオン積 $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-14} \text{ (mol/L)}$ を用いよ。	2024/5/2
本冊	72	132	11行目	下の(3)	下の(4)	2024/5/20
本冊	72	132（2）	---	モル溶液	モル濃度	2024/5/20
本冊	74	---	ページ欄外	〈ページ右上に追加〉	問題136～139で，必要があれば，水のイオン積 $[H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14} \text{ (mol/L)}$ を用いよ。	2024/5/2
本冊	85	159（3）	2行目	(mol/L)	(mol/L)	2024/8/2
本冊	86	161	1行目	[A] ～ [C] の各実験を	[A] ～ [D] の各実験を	2024/6/19
本冊	101	187（6）	3行目	〈文末に追加〉	（ファラデー定数 $F = 9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$ ）	2024/8/5
本冊	132	235	選択肢2行目	硫酸鉄（Ⅱ）	塩化鉄（Ⅱ）	2025/4/14
本冊	139	243	問題タイトル	ランベント・ベールの法則	ランベルト・ベールの法則	2025/2/10
本冊	140	244（3）	1～2行目	それぞれ何種類の立体異性体が	立体異性体を含めてそれぞれ何種類の異性体が	2024/9/3
本冊	151	268	3行目	炭素原子には	炭素原子に	2024/7/31
本冊	205	355	表 システインの側鎖	H-S-(CH ₂) ₂ -	H-S-CH ₂ -	2024/12/24
本冊	205	355①	2行目	メチオニン	システイン	2024/12/24
本冊	209	361	問題タイトル	トレオニン・酒石酸の立体異性体	トレオニンの立体異性体	2024/7/31
本冊	370	370	10～11行目	凝固させる	塩析する	2024/8/19
本冊	217	373	9行目	〈文末に追加〉	（気体定数 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol})$ ））	2024/8/5
別冊解答	2	1 解説（4）④	全文	同族元素のイオン半径は，原子半径と同様に説明できるが，同周期元素では，ふつう1，2，13族元素はその周期の1つ前の周期の貴ガスの電子配置をもつ陽イオンになるので，この順にイオン半径は小さくなる。16，17族元素はその周期の貴ガスの電子配置をもつ陰イオンになるので，この順にイオン半径は大きくなる。つまり，原子番号とイオン半径は一定の傾向を示さない。	同族元素のイオン半径は，原子半径と同様に説明できる。一方，同周期元素では，1，2，13族元素はその周期の1つ前の周期の貴ガスの電子配置をもつ陽イオンになるととの原子半径よりも小さくなる。16，17族元素の原子はその周期の貴ガスの電子配置をもつ陰イオンになるととの原子半径よりも大きくなる。つまり，原子番号とイオン半径は一定の傾向を示さない。	2024/4/2
別冊解答	4	4 解説（3）	12行目	〈Fの周囲の「・」の数〉	〈1個削除して7個に〉	2025/4/9
別冊解答	17	21 解説（2）	---	〈全文差し替え（補足は削除）〉	〈図版リスト：1に差し替え〉	2024/5/3
別冊解答	28	40 解説（3）	7行目	〔mol〕	〔/mol〕	2024/4/29
別冊解答	28	40 参考	23行目	〈数式中の数字2か所〉4	8	2024/4/29
別冊解答	43	65 解答（3）	---	5.6g	5.7g	2024/5/8

ページ	問題番号など	訂正行	訂正前（誤）	訂正後（正）	訂正日
別冊解答	43	65 解説（2）	4・9行目	52.4	52.38
別冊解答	43	65 解説（2）	10行目	42.88	42.85
別冊解答	43	65 解説（3）	5行目	52.4	52.38
別冊解答	43	65 解説（3）	6行目	5.6	5.72≒5.7
別冊解答	60	89 解答（4）	反応式左辺	5O₂	5O₂（気）
別冊解答	73	107 解答（4）	---	O₂の生成速度0.080mol/L・分	O₂の生成速度0.0794mol/L・分
別冊解答	73	107 解説（2）	2行目	<i>k</i>=0.294〔/分〕	<i>k</i>=0.2941≒0.294〔/分〕
別冊解答	73	107 解説（3）	1行目	=0.294×0.540=0.159	=0.2941×0.540=0.1588≒0.159
別冊解答	73	107 解説（4）	5行目	0.5である。	0.5より、
別冊解答	73	107 解説（4）	6行目	NO₂の生成速度 0.159×2=0.318〔mol/L・分〕	<i>v</i>_{NO₂}</sub> 0.1588×2=0.3176≒0.318〔mol/L・分〕
別冊解答	73	107 解説（4）	7行目	O₂の生成速度 0.159×0.5=0.080〔mol/L・分〕	<i>v</i>_{O₂}</sub> 0.1588×0.5=0.0794〔mol/L・分〕
別冊解答	74	108 解答（1）	---	<i>dC</i>/<i>dt</i>= -<i>kC²</sup></i>	-<i>dC</i>/<i>dt</i>= <i>kC²</sup></i>
別冊解答	74	108 解説（1）	2～3行目	反応物の濃度<i>C</i>の変化する速さ	ヨウ化水素の分解速度－
別冊解答	90	132 解説（2）	7行目	モル溶液	モル濃度
別冊解答	97	142 解説（1）	6行目の反応式右辺	H₂O	NaCl
別冊解答	101	148 解説（1）	7行目	〔 H⁺ 〕 から始まる式の末尾に追加）	……①
別冊解答	106	157 解説ア	7行目	=1.21	=1.20
別冊解答	110	161 解説（1）～（3） [D]	7行目の反応式右辺	Mn²⁺	2Mn²⁺
別冊解答	112	163 解説	12行目	NaC₂O₄	Na₂C₂O₄
別冊解答	112	163 解説（2）	5行目	KMnO₄⁻	KMnO₄
別冊解答	112	163 解説（2）	7行目	C₂O₄²⁻	Na₂C₂O₄
別冊解答	113	164 解説（1）	4行目の反応式右辺	O₂+2H₂O	O₂+H₂O
別冊解答	113	164 解説（2）	1行目	Na₂S₂O₂	Na₂S₂O₃
別冊解答	115	168 解説（2）	10行目の反応式	2O₂O₃²⁻+2e⁻→S₄O₆²⁻	2O₂O₃²⁻→S₄O₆²⁻+2e⁻
別冊解答	140	200 解答（3）(b)	---	褐色	黒褐色
別冊解答	170	235 解答，解説	解答H，最終行	FeSO₄	FeCl₂
別冊解答	171	238 解答⑥	---	KFe [Fe (CN)] ₆	Fe₄ [Fe (CN) ₆] ₃
別冊解答	171	238 解説（c）	2～3行目	〈反応式を変更する〉	4Fe+3K₄ [Fe (CN) ₆] →Fe₄ [Fe (CN) ₆] ₃↓（濃青）+12K⁺
別冊解答	175	243 解答（3）	---	<i>C</i>=3.0×10⁻⁶〔mol/L〕	<i>C</i>=3.0×10⁻⁸〔mol/L〕
別冊解答	176	243 解説（3）	8行目	<i>C</i>=3.0×10⁻⁶〔mol/L〕	<i>C</i>=3.0×10⁻⁸〔mol/L〕
別冊解答	183	249 参考 環式化合物の～	一番目の反応式	〈左辺の三員環〉OH₂	CH₂
別冊解答	195	261 解説（2）(ii)	---	〈文末に追加〉	つまり，この油脂1molに付加しうるI₂は6molである。また，定義より，油脂100gに付加しうるI₂（分子量254）のグラム数がヨウ素価であるから，（100/878）×6×254≒174
別冊解答	211	276 解答（3）	1番目の反応式	〈行頭に追加〉	（イ）
別冊解答	211	276 解説	10行目	アセトンが生成する。	アセトンが生成する
別冊解答	211	276 解説	右段24行目	<i>n</i>=1	<i>n</i>≒1
別冊解答	216	282 解説（2）	3番目の反応式	〈（副）の化合物の構造式〉	〈*を削除する〉
別冊解答	230	299 解答（2）	---	アルキド樹脂	グリプタル樹脂（アルキド樹脂）
別冊解答	231	299 解説（2）	反応式の説明文	アルキド樹脂	グリプタル樹脂
別冊解答	231	300 補足	（b）の反応式	〈2番目，3番目の化合物の構造式〉	〈1番目の化合物と同じ位置にCを追加する〉
別冊解答	250	318 参考（後者）	後ろから8行目	一旦	一旦
別冊解答	259	327 参考	5,7行目	ヒドロキシケトン基	α-ヒドロキシケトン基（2か所）
別冊解答	289	356 解答（1）	---	-Gys-	-Cys-
別冊解答	318	383 参考 光透過性高分子	2行目	結晶しにくい	結晶化しにくい

◁</>で囲まれた部分は以下のような文字です

下線 <u>□</u>


イタリック <i>□</i>

太字 □


上付き [□]

下付き _□

(2) TiO_2 の結晶を網線をつけた面で考えると,



題意より, $\angle BDC = 120^\circ$ なので, $\triangle BDC$ は底角 30° の二等辺三角形である。



$\triangle BDH$ において, $DH : BH = y : \frac{b}{2} = 1 : \sqrt{3}$ より

$$\therefore y = \frac{b}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}b}{6}$$

$$\text{求める長さ } x = AH - DH = \frac{\sqrt{2}a}{2} - \frac{\sqrt{3}b}{6} = \frac{3\sqrt{2}a - \sqrt{3}b}{6}$$

$a = 0.45\text{nm}, b = 0.30\text{nm}$ を代入すると

$$x = \frac{3 \times 1.41 \times 0.45 - 1.73 \times 0.30}{6} = 0.230 \div 0.23 [\text{nm}]$$