

3版化学の新研究 正誤表 3刷用

【注】「電子（を）吸引（性・力）」→「電子（を）求引（性・力）」は、どちらの表記も存在しますが後者がより適切と判断して修正しました。数が多いので正誤表には入れていません。

ページ	問題番号など	訂正行	訂正前（誤）	訂正後（正）
9	第1章 扉 ラボアジエ	4行目	熱素	燃素
210	8 詳説18	10行目	飽和硫酸ナトリウム	飽和硫酸アンモニウム
215	2	9行目・12行目	kJ/mol 〈4か所〉	kJ 〈4か所〉
235	2	図	〈シュウ酸ジフェニルの構造式〉	〈ベンゼン環には含まれている部分のC=Oを2つにする〉
247	[Science Box]	左段下から12行目	$[\log_{10} e][A]$	$\log_{10} e[A]$
247	[Science Box]	例題〈後者〉6行目	^{138}Ba	^{137}Ba
254	6 例題〈前者〉	グラフの横軸の単位	K	K^{-1}
330	15 □1	3, 5, 13行目	NaCO_3 〈2か所〉	Na_2CO_3
341	[Science Box]	---	〈大幅修正につきページ差し替え〉	〈差し替えPDFがありますのでお問い合わせください〉
341	[Science Box]	---	〈複数個所の修正〉	〈図版リスト：2に差し替え〉
368	[Science Box]	右段下から7, 9行目	2.50×10^{-5}	2.50×10^{-4}
383	[Science Box] トタンとブリキの腐食	右段＊の1行目	Su	Sn
451	7（訂正後8）	1行目	7 硫酸の性質	8 硫酸の性質
496	4 詳説17	9行目	合いやすので	合いやすいので
501	[Science Box]	〔4〕1行目	日本量	日本酒
508	2 詳説7	反応式の3行目	3OH	3OH^{-}
510	4 詳説12	13～15行目	ミョウバンの結晶を100℃付近まで熱すると、自身のもつ結晶水中に溶解するが、さらに200℃付近まで熱すると、すべての配位水を失って、	ミョウバンの結晶を約65℃に熱すると、 $\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ に変化するが、さらに220℃付近まで熱すると、すべての水和水を失って、
588	8 詳説12	14行目	配座がすべて重なり形であり	配座の2か所が重なり形であり
589	[Science Box]	右段末尾	19種類	20種類

ページ	問題番号など	訂正行	訂正前（誤）	訂正後（正）
596	5 補足14	---	〈構成変更と修正〉	〈図版リスト4：に差し替え〉
633	2 詳説2	図（キ）	R1＊	〈＊を削除〉
644	7	1行目	カルボキシ基とヒドロキシ基とを	－COOHとアルコール性の－OHを
728	7	タイトル，反応式	カップリング	ジアゾカップリング
728	7	5行目	カップリング	ジアゾカップリング（カップリング）
730	[Science Box]	5行目	ジアミノアゾベンゼン	ジアゾアミノベンゼン
777	6 ►段落	2行目	（主に2位）	〈削除〉
811	[Science Box]	右段〔2〕8～9行目	結局，GlyのN－Hと隣のProやHypのC＝Oとの間で水素結合が形成され，	結局，GlyのN－Hから数えて4番目のProやHypのC＝Oとの間で水素結合が形成され，かつ，Hypの側鎖の－OHの水素結合によって
814	8 □2 詳説19	9行目	キノン型	キノイド
814	8 □2 詳説19	反応式	〈最後の構造式〉	〈Nの右上に⊕（○の中に+）を追加〉
830	4 詳説4	10行目	ADP + H ₂ P ₂ O ₇	ADP+H ₃ PO ₄
844	5	1～4行目	〈全文差し替え〉	〈図版リスト：9に差し替え〉

ページ	問題番号など	訂正行	訂正前（誤）	訂正後（正）
844	5 補足15	5～7行目	結晶部分が多い（非結晶部分は少ない）。このため、染料分子が内部へ拡散しにくく染色性が悪い。そこで、他成分との共重合によって分子間力を弱めると、非結晶部分が多くなり、染色性が向上する。また、アクリロニトリルに塩化ビニルを共重合させたものは、	結晶部分が多い。このため、染料分子が内部へ拡散しにくく染色性が悪い。そこで、他成分との共重合によって分子間力を弱めると、非結晶部分が多くなり、染色性が向上する。また、アクリロニトリルに塩化ビニルCH ₂ =CHCl を共重合させたモダクリル繊維は、
885	索引	4段目28行目	〈追加〉	ジアゾカップリング 728
893	索引	4段目30行目	〈追加〉	モダクリル繊維



<></>で囲まれた部分は以下のような文字です

- 下線 <u>□ </u>
- イタリック <i>□ </i>
- 太字 □
- 上付き [□]
- 下付き _□

お使いの刷数によっては、修正済みのものも含まれています。（正誤表をご覧ください。）

1 : p.255 詳説14

詳説 ¹⁴ H₂O₂ の分解反応における Fe³⁺ の触媒作用は次式で表される。



このように、Fe³⁺ と Fe²⁺ との間の酸化還元反応の繰り返しによって、H₂O₂ の分解反応が促進されると考えられる。

一方、微量で触媒作用を著しく減少させる物質を**触媒毒**といい、NH₃ 合成で使用する鉄触媒に対する硫黄 S や一酸化炭素 CO、HNO₃ 合成で使用する白金触媒に対する硫黄 S、リン P、ヒ素 As などがその例である。

一般に、15 族や 16 族の単体や化合物のうち、非共有電子対をもつものは触媒毒となりうる。また、ときには、反応の生成物が触媒作用を示すことがある。これを**自触媒作用**という。酸性条件における過マンガン酸イオンによる酸化作用は、その生成物であるマンガン(Ⅱ)イオンによって著しく促進される(p. 553)。これは、Mn²⁺ による自触媒作用の例である。

2 : p.341 [Science Box] 右段

電気的中性の条件式では、次式が成り立つ。

$$\begin{aligned} &[\text{Na}^+] + [\text{H}^+] \\ &= [\text{HCO}_3^-] + 2[\text{CO}_3^{2-}] + [\text{OH}^-] \end{aligned}$$

ただし、 $[\text{Na}^+] \gg [\text{H}^+]$ と考慮すると、

$$0.10 = [\text{HCO}_3^-] + 2[\text{CO}_3^{2-}] + [\text{OH}^-] \cdots\cdots\textcircled{B}$$

$$\begin{aligned} [\text{H}_2\text{CO}_3] &= \frac{[\text{H}^+][\text{HCO}_3^-]}{K_1} \\ [\text{CO}_3^{2-}] &= \frac{K_2[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}^+]} \\ [\text{OH}^-] &= \frac{K_w}{[\text{H}^+]} \end{aligned}$$

これらを①、②式へ代入すると、

$$0.10 = [\text{HCO}_3^-] \left(\frac{[\text{H}^+]}{K_1} + 1 + \frac{K_2}{[\text{H}^+]} \right) \cdots\cdots\textcircled{C}$$

$$0.10 = [\text{HCO}_3^-] \left(1 + \frac{2K_2}{[\text{H}^+]} + \frac{K_w}{[\text{H}^+]} \right) \cdots\cdots\textcircled{D}$$



③=④より、

$$\begin{aligned} \frac{[\text{H}^+]}{K_1} + 1 + \frac{K_2}{[\text{H}^+]} &= 1 + \frac{2K_2}{[\text{H}^+]} + \frac{K_w}{[\text{H}^+]} \\ \frac{[\text{H}^+]}{K_1} &= \frac{K_2 + K_w}{[\text{H}^+]} \quad [\text{H}^+]^2 = K_1K_2 + K_1K_w \\ \therefore [\text{H}^+] &= \sqrt{K_1K_2 + K_1K_w} \\ &= \sqrt{10^{-16.6} + 10^{-20.3}} \\ &\approx \sqrt{10^{-16.6}} = 10^{-8.3} (\text{mol/L}) \end{aligned}$$




前乗

補足²² SiO_2 はフッ化水素酸 HF には溶けるが、フッ化ナトリウム NaF やフッ化アンモニウム NH_4F 水溶液には溶けないことから、 SiO_2 を攻撃する主役はフッ化物イオン F^- ではなく、次式で生成する二フッ化水素イオン HF_2^- (HF と F^- が水素結合で会合したイオン)と考えられている。



Si と O の電気陰性度は 1.9 と 3.4 であるから、 Si-O 結合はかなり強い極性をもつ。上図左のように、中心の $\text{Si}^{\delta+}$ を HF_2^- が攻撃して、新たに Si-F 結合ができると、 HF_2^- 中の水素結合が切れて HF が脱離する。一方、背後にある Si-O 結合の $\text{O}^{\delta-}$ には H^+ が結合して OH となり、点線部分で Si-O 結合が切れる。この反応の繰り返しのによって SiF_4 を生成する。水溶液中ではさらに 2 分子の HF が配位結合して、水溶性のヘキサフルオロケイ酸イオン $[\text{SiF}_6]^{2-}$ という錯イオンとなる。これをふつうヘキサフルオロケイ酸 H_2SiF_6 (強酸) として表す。なお、フッ化水素酸はガラスを溶かすため、ポリエチレン容器に保存しなければならない。


補足¹⁴ この酸化反応は、下図のような環状中間体を経て進行するので、シス付加となる。




($3\text{H}_2\text{MnO}_4^- \longrightarrow 2\text{MnO}_2 + \text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{OH}^-$ の自己酸化還元反応(不均化反応)で生じた MnO_4^- は、再びエチレンを酸化するのに使われる。)

また、塩基性では、 KMnO_4 の酸化力はそれほど強くないので、アルケンの C=C 結合のうち、弱いほうの π 結合だけが切断されて中間体が生成されるが、酸性条件にすると KMnO_4 の酸化力が強くなり、強いほうの σ 結合も切断されてしまう (p. 597)。


詳説⁸ β -シート構造には、平行型 (ケラチンを引き伸ばした構造) と逆平行型 (絹のフィブロイン) がある。一般に、平行型より逆平行型の方が水素結合は強く働くが、逆平行型では、側鎖 R- が向かい合っている




るので、 R- が大きくなると水素結合が形成されにくくなる。フィブロインの場合、 R- が小さいもの (Gly や Ala など) が多く逆平行型が安定となる (p. 838)。 R- が大きいものが多くなると、 β -シート構造より α -ヘリックス構造の方が安定となる。



詳説 20 システインに濃 NaOH 水溶液を加えて加熱すると、塩基の OH^- がシステインのカルボニル基に隣接する α 位の H を H^+ として引き抜いた後、電子の移動が起こると、デヒドロアラニン（アラニンから脱水素された非天然型アミノ酸）と硫化水素イオン HS^- を生じる。 HS^- は直ちに中和されて S^{2-} となり、 Pb^{2+} と反応し PbS の黒色沈殿を生じる。



メチオニンの場合、システインと同様の反応が起こると、デヒドロアラニンと硫化ジメチル $(\text{CH}_3)_2\text{S}$ を生じる。ただし、硫化ジメチルから S^{2-} を脱離させるためには、NaOH 水溶液との加熱では困難であり、より高温となる NaOH 融解液との反応が必要となる。



一般に、インドール環中では、ベンゼン環よりもピロール環の反応性が高い。これは、六員環に 6 個の π 電子が存在するベンゼン環よりも、五員環に 6 個の π 電子が存在するピロール環の方が電子密度が高いからである。また、ピロール環の反応性は 3 位 > 2 位 > 1 位である。

トリプトファンの場合、ピロール環の 3 位にアミノ酸の基本骨格が結合しているので、濃硝酸との反応でニトロ化されるのは、2 位である。また、濃硝酸との反応では、電子密度の大きなピロール環自体が酸化される副反応がおこる可能性が高い。

実際、タンパク質中のトリプトファンは、チロシンに比べて $\frac{1}{4} \sim \frac{1}{6}$ 程度と少ないことから、タンパク質水溶液のキサントプロテイン反応は、主にチロシンによっておこっていると考えられる。

(3) フェニルアラニンのキサントプロテイン反応

フェニルアラニンは、濃硝酸に対してはキサントプロテイン反応は陰性であったが、混酸に溶かして加熱すると淡黄色を示し、塩基性になると黄褐色沈殿に変化した。これより、フェニルアラニンのキサントプロテイン反応は混酸に対しては陽性であるといえる。

6 : p.814 詳説20


7 : p.817 [Science Box]

8 : p.818 [Science Box]


(1) 含硫アミノ酸の硫化鉛(II)反応
【実験】① システイン、シスチン、メチオニン 0.05 g を試験管に取り、2 mol/L NaOH 水溶液 2 mL を加え、2 分間加熱する。
② ①の各水溶液に、0.1 mol/L 酢酸鉛(II) (CH₃COO)₂Pb 水溶液 1 mL を加える。
③ ②の各水溶液を、さらに加熱する。
【結果】実験②と③より、最も硫化鉛(II)反応がおりやすいのはシスチンであり、次いでシステインが反応しやすく、しかし、メチオニンはいずれの場合でも反応しなかった。

	システイン	シスチン	メチオニン
実験①	無色溶液	黄色溶液	無色溶液
実験②	無色溶液	黒色沈殿	無色溶液
実験③	黒色沈殿	黒色沈殿	無色溶液


(2) シスチンの硫化鉛(II)反応
シスチンの場合、NaOH 水溶液と加熱すると、OH⁻の求核攻撃によりα位のHからH⁺が引き抜かれ、その隣のβ位のC-S結合が切断され、シスチンジスルホネートとデヒドロアラニンが生成する。このうち、シスチンジスルホネートのS-S結合は、強塩基性で加熱すると、S原子を放出する反応(硫黄放出反応)が起こってシスチンシルホネートとなり、直ちにデヒドロアラニンと結合して、ランチオニン(シスチンからS原子が1個抜けた非天然型アミノ酸)を生成すると考えられている。



(3) システインの硫化鉛(II)反応
システインを NaOH 水溶液に加えて加熱すると、塩基である OH⁻がカルボニル基に隣接するα位のC原子に結合したH原子からH⁺を引き抜く。この反応が起こるのは、カルボニル基の電子求引性によりα位のH原子が少し酸の性質をもつからである。H⁺の引き抜き後、電子の移動が起こり、デヒドロアラニンと硫化水素イオン HS⁻が生成する。HS⁻は OH⁻で中和されて S²⁻が生じ、Pb²⁺と反応して PbS を生成する。



(4) メチオニンの硫化鉛(II)反応
メチオニンを NaOH 水溶液に加えて加熱すると、システインと同様に、塩基である OH⁻がカルボニル基に隣接するα位からH⁺を引き抜き、電子の移動を経て、デヒドロアラニンと硫化ジメチルを生じる。



メチオニンの場合、NaOH 水溶液を加熱しても生成した硫化ジメチルからの硫黄Sの脱離は起こらず、PbSも生成しない。一方、NaOHの融解状態(融点318℃)では、高温で反応が進行するため、硫化ジメチルからでも硫黄Sの脱離が起こり、PbSが生成したと考えられる。

一般的に、硫化鉛(II)反応は含硫アミノ酸よりもタンパク質の方が進行しやすい。これは、タンパク質中のS原子のほとんどはシステインのようなチオール基-SHではなく、シスチンのようなジスルフィド結合-S-S-で存在するからと考えられる。

9 : p.844 1~4行目

アクリロニトリル CH₂=CHCN を付加重合して得られるポリアクリロニトリルは染色性が良くない。そこで、アクリロニトリルと少量のアクリル酸メチル CH₂=CHCOOCH₃ や酢酸ビニル CH₂=CHOCOCH₃ などとの共重合体 (p. 740) として使用されることが多い。一般に、ポリアクリロニトリルの含有率(質量%)が85%以上の合成繊維を**アクリル繊維**、35~85%未満のものを**モダクリル繊維**という¹⁵⁾。